





PRECIPITACIÓN ACUMULADA 20/05/09 AL 26/05/09 (27/05 9hs)



Reservas: ESTADO DE LAS RESERVAS AL 27/05/09

Detalles: <p style="text-align: justify;">La demanda de agua como para devolver las reservas de humedad a valores adecuados no es demasiado abultada, principalmente si se tiene en cuenta el comportamiento pluvial de lo que va de mayo. Con unos 20 milímetros los lotes del sur que potencialmente podrán ser destinados a sembrar trigo, estarán en condiciones adecuadas para la implantación. La demanda crece hacia el norte, sector que estará en contacto con sistemas precipitantes de importancia en las próximas horas y puede experimentar mejoras significativas.
La situación para las siembras está lejos de ser la ideal, pero como vemos no solo es una cuestión climática. Es decir, esta variable que tiene mucho peso a la hora de decidir la implantación tiene perspectivas favorables para su evolución, sin embargo otras coyunturas son más inciertas.
Fuera del ámbito de la provincia de ER, en zonas extrapampeanas se han producido lluvias muy significativas, principalmente en Formosa y Misiones. En estas provincias se han sumado en algunos casos hasta 300 milímetros. Esta condición se repite en el este de Paraguay y los estados brasileños que contienen las nacientes de los principales ríos mesopotámicos. Estos excesos hídricos deberán traducirse en las próximas semanas en una mejora del caudal de los ríos Uruguay y Paraná.
</p></p>




Sección: DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS DOS ÚLTIMAS CAMPAÑAS AGRÍCOLAS EN ENTRE RÍOS

El siguiente cuadro compara los datos estadísticos finales de trigo, lino, girasol y maíz de las dos últimas campañas agrícolas en Entre Ríos.

Cultivo	2007/08 Sup. Sembrada (ha)	2008/09 Sup. Sembrada (ha)	2008/09 Sup. Cosechada (ha)	2008/09 Variación Sup. (%)	2007/08 Producción (Tn)	2008/09 Producción (Tn)
Trigo	312.320	254.993	222.702	-18,36%	879.285	480.649
Lino	6.080	14.850	14.790	144,24%	5.416	15.724
Girasol	72.695	47.366	44.266	-34,84%	139.499	51.888
Maíz	189.240	152.097	89.927	-19,63%	912.455	212.069

Sección: ACTUALIZACION PERSPECTIVAS CLIMATICAS A LARGO PLAZO - Dr. José Luis Aiello

Mostramos en primer lugar el estado de las resevas de agua en el suelo para la Pampa Húmeda al 26/5/09.




Sección:

Es claro observar que en la Provincia de Entre Ríos las reservas se encuentran en el estado denominado RESERVA ADECUADA en casi toda la región provincial.. Esto es lo que se viene observando en cuanto a la evolución de las reservas, o sea, una situación buena en el este de la región pampeana y un estado de reservas escasas en el centro y oeste (ver Sta. Fe, Bs. As., Córdoba y La Pampa), LO QUE COLOCA EN UNA DE LAS MEJORES SITUACIONES A LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

Reiteramos en forma permanente que, cuando se piensa a mediano y largo plazo hay que tener presente que tanto las lluvias como las temperaturas u otras variables son DEPENDIENTES DE FACTORES DE GRAN ESCALA y de FACTORES REGIONALES (que no son pronosticables con anticipación a largo plazo).

Nuestro aporte y recomendación es el continuo seguimiento de nuestros pronósticos provinciales en el corto y largo plazo que producimos periódicamente y el uso de toda la información DE DETALLE que publicamos SEMANALMENTE.

Es muy importante mostrar el estado actual del Pacífico, y al 26/5/09 la situación es la siguiente:



Sección:

Como puede observarse TENEMOS EL PACIFICO CON UN LEVE CALENTAMIENTO, o sea, hemos salido del escenario frío (que se asoció con LA NIÑA) que impacto negativamente durante la anterior campaña.

Y los pronósticos de temperaturas superficiales muestran que lentamente habrá una evolución HACIA UN ESTADO DE CALENTAMIENTO, CON LO CUAL TENDRIAMOS LA PROXIMA COSECHA GRUESA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS BAJO UN NIÑO DE BAJA INTENSIDAD !

Los próximos tres meses la Provincia de Entre Ríos recibirá lluvias alrededor de los valores normales y ya a partir de octubre del corriente año comenzarán a sentirse los efectos del estado del Pacífico y es muy probable que la GRUESA tenga lluvias en o por encima de los valores normales. O sea, estaríamos en un escenario que es uno de los mejores para la Provincia.

Nota: Los mapas que corresponden a los indicadores del Pacífico tienen como fuente la NOAA de USA y el CPTEC de Brasil. Y recordemos que todos los pronósticos tienen implícitas las aproximaciones físicas, y deben ser utilizados bajo estas condiciones.

Sección: SIEMBRA DE TRIGO

Lentamente avanza la implantación del cereal en el ámbito provincial, habiéndose concretado menos del 5% de la intención de siembra.

En base a consultas efectuadas a la Red de Colaboradores, al día de la fecha se estima que la superficie triguera para la Campaña 2009/10 experimentaría una disminución que oscila entre el 15% y el 20% con respecto al ciclo agrícola anterior.

No obstante, este hecho se encuentra muy ligado al factor climático, ya que si se concreta la ocurrencia de precipitaciones en las próximas semanas que generen un cambio en las reservas del perfil de los suelos, la estimación podría revertirse positivamente.

Otro factor determinante en la definición del área cultivada es la fijación del precio de los arriendos, los cuales en muchos casos se están pactando a porcentaje de la producción o en menos quintales fijos de soja por hectárea.

Sección: SIEMBRA DE LINO

Escasos lotes de lino se han implantado hasta el momento en el territorio provincial. La intención de siembra, como ya se había dado a conocer en informes anteriores es superior a la campaña anterior. El logro de este objetivo está directamente relacionado a la disponibilidad de simiente en el mercado.

Sección: COSECHA DE SORGO

El avance en la cosecha de sorgo experimentó en la última quincena un aumento de diez puntos porcentuales con respecto a lo informado el día 14 del corriente.

El reporte de los Colaboradores de la Red indica que el avance de Cosecha se ubica entre el **85 – 87%** del total implantado, manteniendo un rinde medio provincial que se ubica en el rango de 3.000 Kg/ha a 3.500 kg/ha, lo cual indica que la producción se ubicaría cercana a las 300.000 toneladas.

Sección: COSECHA DE SOJA


Faltando la trilla de algunos pocos lotes prácticamente se da por finalizada la campaña sojera 2008/09, la cual se caracterizó por una disminución importante en superficie sembrada, rendimiento y producción.

Los números estarían indicando que del 1.117.000 ha implantadas, se obtuvo una producción aproximada al 1.000.000 tn – 1.100.000 tn, cifra que expresa que Entre Ríos cuenta con un tercio del tonelaje producido en el 2007/08, el cual estuvo muy cercano a los 3.000.000 de toneladas.


Proximamente la Bolsa de Cereales de Entre Ríos elaborará el informe final de rendimiento y producción de la

oleaginosa por departamento.


Sección: CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA SEMANA DEL 21 AL 27 DE MAYO DE 2009



Sección:




Sección:




Sección:


Un nuevo retroceso en la disminución de las temperaturas fue la característica de los últimos siete días. Si bien las temperaturas no fueron tan elevadas continúan siendo atípicas para esta época del año. Las mínimas siempre estuvieron muy por encima de cero y en promedio cerca de los 6°C. Las máximas fueron muy elevadas, superando los 30°C permitiendo así una temperatura media durante todo el período de aproximadamente 20°C, más adecuada al principio de la primavera que al final del otoño.



Sección:



Sección:



Sección:

Las altas temperaturas registradas y el gran contenido de humedad en el aire presente durante la última semana elevaron los registros de Humedad Relativa ambiente a valores moderadamente altos, aumentando al mismo tiempo tanto la humedad foliar media como las horas de mojado foliar acumuladas. La presencia de algunas leves lluvias no alcanzó para mejorar la situación de escasa humedad del suelo ni para disminuir la tasa de radiación solar, que se mantiene en valores normales para la época del año.