

Informe Climático de la semana del 22/06/2011 al 28/06/2011 y Estado de las Reservas al 29/06/2011.

Fecha: 30 de junio de 2011


Lluvias: PRECIPITACIÓN ACUMULADA DESDE EL 22 AL 28 DE JUNIO DEL 2011

Detalles: Las lluvias que se representan en el mapa corresponden principalmente a la jornada del miércoles 22 y parte del jueves 23, aunque debemos remarcar que las lloviznas se sostuvieron en algunos casos durante la jornada del viernes. La oferta de agua fue más importante que la esperada, sobre todo en la franja central de la provincia. La vasta red de pluviómetros que conforman los colaboradores del proyecto SIBER, permiten detectar eventos que de otro modo no se hubiesen registrado. Nos referimos puntualmente a las celdas de tormenta que se generaron en el sudeste de Villaguay y que dejaron acumulados de entre 70 y 100 milímetros. Estas marcas son muy inusuales para la época del año y por cierto más para una sola jornada. Claramente la franja central fue la que recibió las lluvias más abundantes y en la mayoría de los casos innecesarias. La situación meteorológica recién comenzó a cambiar de manera más definida ingresando al fin de semana. Si bien el viernes ya comenzó a sentirse el ingreso del aire frío a partir de la rotación de los vientos al sector sur, las jornadas comenzaron a volverse soleadas recién durante el sábado, justamente durante aquella jornada los vientos perdieron intensidad y la madrugada despejada del domingo facilitó el fuerte enfriamiento nocturno, que se tradujo en heladas a partir del domingo. Este intenso frío se ha sostenido hasta hoy, aunque más moderado en los últimos días, principalmente con máximas más templadas. Esta es la primera masa de aire frío que genera heladas generalizadas en la provincia de ER en esta temporada invernal. Los enfriamientos del otoño habrían sido esporádicos y sin persistencia. Por delante tenemos un situación meteorológica que tenderá a mantenerse estable y libre de precipitaciones a pesar de los pasajes de nubosidad. Las condiciones ambientales frías a muy frías se mantendrán a partir de un nuevo ingreso de aire frío en las próximas horas.



PRECIPITACIÓN ACUMULADA
22/06/11 al 28/06/11

C.A.



Sección: DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS DOS ÚLTIMAS CAMPAÑAS AGRÍCOLAS EN ENTRE RÍOS

El siguiente cuadro compara los datos estadísticos finales de trigo, lino, girasol, arroz y soja de las dos últimas campañas agrícolas en Entre Ríos.

Cultivo	2009/10 Sup. Sembrada (ha)	2010/11 Sup. Sembrada (ha)	2010/11 Sup. Cosechada (ha)	2010/11 Variación Superficie (%)	2009/10 Producción (tn)	2010/11 Producción (tn)	2010/11 Variación Producción (%)
Trigo	327.589	279.470	279.470	-14,69%	1.152.481	1.074.359	-6,78%
Lino	28.050	21.600	21.600	-43,23%	48.771	26.375	-45,92%
Girasol	17.431	20.347	20.017	16,73%	15.878	35.661	130,89%
Arroz	91.735	99.608	99.608	8,58%	578.368	712.217	23,14%
Soja	1.308.786	1.312.350	1.312.350	0,27%	3.554.684	3.018.241	-15,09%


Sección: SIEMBRA DE FINA - COSECHA DE MAIZ Y SORGO DE 2da.

Debido a la ocurrencia de nuevas precipitaciones en todo el territorio provincial, las labores de siembra de cultivos de fina como así también el avance en la cosecha de maíz y sorgo de 2da. se vieron prácticamente paralizadas en el transcurso de la presente semana.


Recien ayer y en el día de hoy los productores han comenzado a intentar proseguir con las tareas avanzando lentamente y a medida que los suelos permiten el transito de la maquinaria.

Es de esperar que, de proseguir el buen tiempo, se generalice la siembra de trigo y lino a fin de alcanzar el mayor número de hectáreas antes de que finalice el mes de julio y se finalice la zafra de granos gruesos.


Sección: CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA SEMANA DEL 23 AL 29 DE JUNIO DEL 2011



Sección:




Sección:




Sección:


El comienzo del invierno cambió totalmente las condiciones de temperatura que predominaron durante el otoño, produciendo un fuerte descenso de las marcas térmicas que las ubicó en valores típicos de la estación. Las temperaturas mínimas registradas por la red de medición descendieron durante los últimos siete días más de 12°C respecto de las de la semana anterior, llegando los valores más extremos a ser inferiores a los 4°C bajo cero. Estos registros ocasionaron la presencia de heladas de variada intensidad, fundamentalmente al comienzo del periodo. Las marcas máximas también acusaron el descenso y solo llegaron a promediar los 16°C. Esta gran amplitud térmica dio como resultado una muy baja temperatura media diaria, que apenas bordeó los 9°C, pero que es acorde con los registros históricos en la misma fecha.



Sección:



Sección:



Sección:

La nueva estación llegó acompañada de condiciones de estabilidad, bajas temperaturas y de un importante descenso de la nubosidad que mejoró enormemente la Tasa de Radiación Solar media, permitiendo que recuperara los valores medios históricos. La disminución del contenido de humedad en el aire, producto del mejoramiento de las condiciones, posibilitó un descenso de la Humedad Relativa aunque, durante los últimos siete días, todavía se mantuvo moderadamente alta. Por su parte la cantidad de horas de Mojado Foliar acumuladas también se vio influenciada por el cambio de las condiciones meteorológicas, descendiendo prácticamente a la mitad de los valores registrados una semana atrás.