
INFORME SEMANAL N° 620

Fecha: 28 de agosto de 2014

Lluvias: PRECIPITACIÓN ACUMULADA DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DEL 2014

Detalles: De acuerdo a lo previsto y aun cuando la humedad se incrementó notoriamente durante la última parte de la semana pasada, las lluvias quedaron totalmente restringidas al sur de la región pampeana. Marginalmente se observaron algunas lloviznas cambiando del domingo para el lunes o en forma más dispersa aun en jornadas anteriores. Como ya hemos mencionado en otras oportunidades, estas lloviznas solo se registran en las estaciones automáticas de la BCER, y son los datos que se vuelcan en el mapa.

Desde la jornada del lunes la circulación del sector sur se hizo presente con mucha intensidad, observándose un marcado cambio de ambiente ya desde la jornada del martes. Los registros térmicos resultantes se acercaron de este modo a marcas propias de la época. Amaneciendo para el miércoles algunos sectores de la provincia reportaron heladas, no demasiado intensas pero que evidencian la eficiente entrada de aire frío. Tras el ingreso de aire frío una vasta zona de alta presión se posicionó en el centro este de la región pampeana, estabilizando la condición atmosférica que comenzó a reflejarse rápidamente en la escasez de nubosidad.

Actualmente la estabilidad de las condiciones meteorológicas toma gran parte del sudeste de Sudamérica y en el corto plazo esto no se modificará sustancialmente. Cambiando del domingo para el lunes aumenta la actividad en el noreste del país, las vecindades de Brasil y Uruguay. No se descarta que algunas precipitaciones puedan concretarse sobre los departamentos del norte entrerriano.

El mes cierra deficitario en cuanto a lluvias y de acuerdo a lo que se perfilaba a finales de julio, no se han presentado jornadas de frío extremo. Esto resume un trimestre de invierno muy benigno.



PRECIPITACIÓN ACUMULADA

20/08/14 al 26/08/14 (9hs 27/08)




Reservas: DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS DOS ÚLTIMAS CAMPAÑAS AGRÍCOLAS EN ENTRE RÍOS

Detalles: El siguiente cuadro compara los datos estadísticos finales de trigo, colza, lino, arroz, girasol, soja, sorgo y maíz de las dos últimas campañas agrícolas en Entre Ríos.

Cultivos	2012/13 Sup. Sembrada (ha)	2013/14 Sup. Sembrada (ha)	2013/14 Sup. Cosechada (ha)	2013/14 Variación Superficie (%)	2012/13 Producción (tn)
Trigo	163.700	270.900	269.400	65,0%	298.950
Colza	34.700	29.100	29.100	-16,0%	26.256
Lino	8.000	13.400	13.320	68,0%	6.840
Arroz	68.400	68.000	68.000	-0,6%	461.900
Girasol	2.820	2.770	2.710	-2,0%	2.747
Soja	1.329.900	1.363.200	1.362.200	2,5%	3.045.360
Sorgo	124.000	120.000	90.400	-3,2%	446.325
Maíz	242.100	264.100	237.500	9,1%	1.339.960

Sección: CONDICIÓN DE TRIGO



Las escasas lluvias del mes de agosto han ocasionado un retroceso en las reservas de los suelos a tal punto que en la actualidad se verifica falta de humedad en la cama de siembra lo cual ha repercutido directamente sobre los cultivos invernales, como así también en el avance de la siembra de maíz.


En cuanto al trigo se refiere, los cultivares de ciclo corto muestran mortandad de hojas basales, en cambio en los ciclo largos e intermedios al tener raíces más profundas los síntomas se manifiestan con menor intensidad.

Otro efecto que se observa es el amarillamiento de las plantas en gran cantidad de lotes, producto de una menor eficiencia del fertilizante nitrogenado que fuera aplicado en condiciones de baja humedad edáfica y afectada por las elevadas temperaturas registradas la semana anterior.

En cuanto a la fenología, la generalidad de los lotes se encuentra en estado de encañazón presentando plantas erectas y de buen porte.

La condición del cereal en la provincia se presenta de muy buena a buena en un 86% y regular a mala en el 14%. Mapa N° 1.

Sección: CONDICIÓN DE COLZA




Para el caso de la colza los problemas ocasionados por el déficit hídrico tienen mayor significancia debido a la etapa de desarrollo que presenta el cultivo ya que los lotes se ubican entre floración, formación de silicuas y llenado de los granos.

Los colaboradores reportan que este último período afectó en gran medida el crecimiento de la oleaginosa y que es imperante la falta de agua. Otra variable que preocupa son los cambios bruscos de temperatura y fundamentalmente las bajas marcas térmicas y heladas acontecidas en el transcurso de la semana.

El área sembrada con la oleaginosa se encuentra en condición muy buena en el 30% de los lotes, buena en el 53,9% y regular en el 16,5%. Gráfico N° 1

Sección: CONDICIÓN DE LINO



La oleaginosa evoluciona favorablemente y su estado fenológico se ubica desde ramificaciones basales a secundarias con una altura promedio de 15 cm. Sin inconvenientes con respecto a insectos y enfermedades. Como se ilustra en el Mapa N° 2, el área sembrada con lino en la provincia presenta una condición muy buena a buena en el 73% y regular a mala en el 27%. Esta última se acentúa en la zona sur y oeste como consecuencia del exceso de agua que se produjo en el momento de la siembra del cultivo, ocasionando pérdida en el stand de plantas, quedando lotes overos y ralos.

Sección: SIEMBRA DE MAÍZ DE PRIMERA


Lentamente continúa la siembra de maíz de primera en algunos sectores de la Provincia, habiéndose incorporado en la presente semana los departamentos Feliciano, Gualeguaychú, La Paz y Uruguay.

Para que el avance de las labores se generalice y se pueda lograr una buena emergencia de plántulas resulta imperiosa la ocurrencia de precipitaciones que mejorarían la humedad superficial del suelo y que se incremente la temperatura del suelo.

Para el actual ciclo el área a implantar podría sufrir una caída que oscilaría entre un 15% y un 20% con respecto a la campaña 2013/14 que alcanzó 193.600 hectáreas.

En el gráfico N° 2 se muestra la superficie sembrada en la campaña 2013/14, la intención de siembra para la actual campaña y su variación en las diferentes zonas en la provincia.

Se observa que la zona oeste es la única que presenta un incremento positivo a causa de la concentración de fábricas de alimento balanceado que utilizan el insumo maíz para consumo animal y otro aspecto importante es la cercanía al puerto de Rosario que provoca una merma en los costos de flete. En las demás zonas la intención de siembra es negativa, si se lo compara con la anterior campaña.



Sección: ALERTA SANITARIO

Las condiciones climáticas que definen el desarrollo de las enfermedades foliares del trigo son desfavorables en los últimos días fundamentalmente en lo que se refiere a las horas de mojado foliar. Este factor es limitante y se detectó un crecimiento muy leve de la incidencia de la roya de la hoja o roya anaranjada (*P. tritica*) en cultivares de conocida susceptibilidad.



Desde mediados de agosto se observa el amarillamiento de las hojas inferiores, que en general no obedece a causas parasitarias. Para que esta anomalía se pueda atribuir a microorganismos patógenos, debe estar asociado al menos con una lesión o mancha sobre las hojas.

La mancha amarilla (*D. tritici-repentis*) permanece en niveles estables y disminuye su incidencia y severidad por muerte de hojas inferiores y aparición de nuevas hojas verdes (efecto "dilución de síntomas").


Cultivares susceptibles a deben ser monitoreados con mayor frecuencia, si se cumplen el pronóstico de lluvias para el fin de semana.

No se han registrado en lotes bajo monitoreo síntomas de septoriosis de la hoja (*S. tritici*).


Puccinia triticina



Drechslera tritici-repentis



Septoria tritici



Sección: