
INFORME PRODUCCIÓN DE TRIGO - CAMPAÑA 2020/21

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos da a conocer el informe correspondiente a la producción de trigo en el ciclo 2020/21 en la provincia de Entre Ríos, Argentina. La Bolsa de Cereales de Entre Ríos agradece a la red de colaboradores por toda la información brindada para la elaboración de esta publicación.

Fecha: 30 de diciembre de 2020

Cultivo:

trigo

Sección: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE TRIGO EN LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Las principales variables que resumen la producción de trigo fueron:

– Superficie sembrada	523.300 hectáreas (ha)
– Superficie perdida	2.700 ha
– Superficie cosechada	520.600 ha
– Rendimiento promedio	2.607 kg/ha
– Producción	1.357.100 toneladas (t)

El ciclo 2020/21 tuvo una expansión del área sembrada de 80.200 ha, esto representó un crecimiento interanual del 18 %. Es importante destacar que es la mayor superficie implantada de los últimos 20 años.

El efecto de la sequía (fundamentalmente en el sector Suroeste) y las heladas tardías fueron los factores que generaron la pérdida de 2.700 ha, lo cual representó el 0,5 % del área cultivada.

El rendimiento promedio provincial experimentó una caída interanual del 3 % (92 kg/ha), en relación al promedio del último lustro la merma fue del 14 % (431 kg/ha).

La producción del cereal tuvo un crecimiento interanual del 13 % (161.010 t) y es la segunda de mayor importancia en las últimas dos décadas.

En la Tabla 1 se detalla la evolución de la producción de trigo en la provincia de Entre Ríos.

Tabla 1: Evolución de la producción de trigo en la provincia de Entre Ríos, Argentina

<i>Campaña</i>	<i>Superficie Sembrada (ha)</i>	<i>Variación (%)</i>	<i>Rendimiento Promedio Kg/ha</i>	<i>Variación (%)</i>	<i>Producción (t)</i>	<i>Variación (%)</i>
2000/01	338.400	---	1.859	---	600.090	---
2001/02	424.500	25	1.092	- 41	453.053	- 25
2002/03	247.300	- 42	1.579	45	387.442	- 14
2003/04	243.500	- 2	2.673	69	650.990	68
2004/05	286.363	18	2.817	5	806.543	24
2005/06	209.720	- 27	3.038	8	637.074	- 21
2006/07	285.740	36	2.828	- 7	782.960	23
2007/08	312.320	9	2.829	0	879.285	12
2008/09	254.993	- 18	2.158	- 24	480.649	- 45
2009/10	327.589	28	3.643	69	1.136.962	137
2010/11	279.470	- 15	3.844	9	1.074.373	- 6
2011/12	280.906	1	3.381	- 12	949.863	- 12
2012/13	163.700	- 42	1.893	- 44	298.950	- 69
2013/14	270.900	65	2.748	45	740.360	148
2014/15	309.700	14	2.480	- 10	766.883	4
2015/16	190.100	- 39	2.956	19	550.330	- 28
2016/17	267.100	41	3.238	10	848.790	54
2017/18	298.000	12	2.523	- 22	751.335	- 11
2018/19	406.300	36	3.773	50	1.530.195	104
2019/20	443.100	9	2.699	- 28	1.196.090	- 22
2020/21	523.300	18	2.607	- 3	1.357.100	13

Sección: FACTORES CLIMÁTICOS

En base a los datos aportados por la red de centrales meteorológicas automáticas perteneciente a la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, se analizaron las principales variables climáticas que se relacionaron con el rendimiento del cereal.

A modo de resumen, se puede afirmar que el año 2020 se caracterizó por bajas temperaturas y escasas precipitaciones, fundamentalmente entre los meses de febrero a octubre.

Temperatura

En la Figura 1 se muestra la cantidad de días con heladas meteorológicas y agronómicas en los meses de mayo a setiembre para los años 2017, 2018, 2019 y 2020. Estos valores representan una cuantificación a nivel regional y fue obtenido del promedio de toda la red de centrales meteorológicas.

En el periodo analizado se contabilizó un total de 10 heladas meteorológicas y 38 heladas agronómicas. Es importante mencionar que, el promedio de los tres últimos años posee un total de seis heladas meteorológicas y 23 heladas agronómicas.


El promedio de la temperatura mínima entre mayo a setiembre en el 2020 fue de 6,9 °C, mientras que el promedio de los últimos tres años se ubica en 9 °C.

En valores promedio, los meses de mayo, julio y setiembre se posicionaron 3 °C por debajo del promedio de los últimos tres años.

Por otra parte, el día más frío en el 2020 fue el martes 14 de julio, donde el promedio de la temperatura mínima fue de -3,5 °C (el promedio de la temperatura más baja de los últimos tres años es de - 2 °C).

Cabe recordar que, durante el periodo crítico del cultivo (20 días previos hasta 10 días posteriores de la floración) el promedio de la temperatura mínima en la región descendió hasta generar dos heladas agronómicas, entre el domingo 20 y el lunes 21 de setiembre. En ese momento había comenzado la antesis de los primeros lotes, hecho que generó en algunos sitios pérdidas importantes en el rendimiento.

Por otra parte, se registraron elevadas temperaturas entre el domingo 18 y el lunes 19 de octubre, donde promedio de la temperatura máxima supero los 35 °C. Este suceso acortó el tiempo de llenado de los granos con un impacto negativo en el rendimiento.



Sección:

Precipitación

En la Figura 2 muestra el comportamiento de la precipitación promedio mensual del año 2020 y la variación con


respecto al promedio de una serie de 16 años (2004 – 2019).

Solamente en enero y julio se registraron precipitaciones superiores al promedio histórico, en el resto hubo montos inferiores.

El mayor déficit se produjo en el trimestre febrero – marzo – abril donde la lluvia acumulada promedio es de 390 mm, lo cual genera normalmente la recarga del perfil edáfico y es una reserva importante para las primeras etapas de crecimiento del trigo.

Entre febrero y abril del 2020 el acumulado promedio fue de 230 mm, es decir una merma del 41 % (160 mm).


Otro momento con marcado descenso de las lluvias fue en el bimestre setiembre – octubre, donde normalmente se reciben 190 mm y en el 2020 hubo 120 mm, una disminución del 37 % (70 mm).



Sección:

En la Figura 3 se muestra la distribución de la lluvia acumulada desde febrero hasta abril y la variación con respecto al promedio normal.


Los menores registros de precipitaciones se posicionaron en el sector Suroeste donde hubo déficits dentro del rango de -250 a -201 mm.



Sección:

En la Figura 4 se muestra la distribución de la lluvia acumulada desde setiembre hasta octubre y la variación con respecto al promedio normal.

Los menores registros de precipitaciones se posicionaron en el sector Noroeste y partes del centro Sur donde hubo déficits dentro del rango de -100 a -76 mm.



Sección: PRODUCCIÓN DE TRIGO EN LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS A NIVEL DEPARTAMENTAL

El departamento Paraná tuvo la mayor área implantada con una participación del 14 % sobre la superficie total, pero debido a los bajos rendimientos, se ubicó en el segundo lugar en relación a la producción, ya que aportó el 12 % de las toneladas totales.

Mientras que, el segundo lugar en base al área cultivada fue para Gualeguaychú con una contribución del 13 % y los buenos rendimientos le otorgaron el primer lugar en relación a la producción, debido a que abarcó el 14 %. Los datos estadísticos sobre la superficie implantada con trigo a nivel departamental se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2: Producción de trigo en la provincia de Entre Ríos a nivel departamental


Departamento	Superficie Sembrada (ha)	Superficie No Cosechada (ha)	Superficie Cosechada (ha)	Rendimiento Promedio (kg/ha)	Producción (t)
Colón	6.300	0	6.300	2.200	13.860
Concordia	4.600	0	4.600	2.800	12.880
Diamante	43.200	200	43.000	2.200	94.600
Federación	2.800	0	2.800	3.300	9.240
Federal	7.900	0	7.900	2.700	21.330
Feliciano	6.300	0	6.300	3.000	18.900
Gualedguay	43.500	0	43.500	2.800	121.800
Gualedguaychú	68.300	700	67.600	2.900	196.040
La Paz	46.000	0	46.000	2.600	119.600
Nogoyá	49.300	500	48.800	2.500	122.000
Paraná	74.100	600	73.500	2.200	161.700
San Salvador	5.900	0	5.900	2.200	12.980
Tala	24.800	0	24.800	2.800	69.440
Uruguay	47.800	300	47.500	2.900	137.750
Victoria	52.600	400	52.200	2.400	125.280
Villaguay	39.900	0	39.900	3.000	119.700
Totales	523.300	2.700	520.600	2.607	1.357.100

Sección: PRODUCCIÓN DE TRIGO EN LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS A NIVEL DE DISTRITO

El distrito con mayor producción fue Pehuajó al Norte (Dpto. Gualedguaychú) con una producción dentro del rango de 60.001 a 65.000 t.

En segundo lugar, de importancia se ubicó Palmar (Dpto. Diamante) con una producción que osciló entre 45.001 a 50.000 t.

En estos dos distritos se concentró el 8 % de las toneladas totales, ver Figura 5.



Sección: CALIDAD DEL TRIGO CAMPAÑA 2020/21

En la Tabla 3 se muestran los datos preliminares de la calidad de trigo para la campaña 2020/21 en base a muestras ingresadas a la Cámara Arbitral de Entre Ríos.

Para ver el mapeo de los resultados en los diferentes departamentos de Entre Ríos ingresar al siguiente enlace:

[MAPEO](#)

Departamentos	PH Min.	PH Prom.	PH Max.	Proteina Min.	Proteina Prom.	Proteina Max.	Dañados Min.	Dañados Prom.	Dañados Max.
Diamante	63,20	80,24	86,40	7,90	11,22	15,50	0,02	0,91	21,16
Federacion	77,40	79,53	80,90	9,90	10,83	11,40	0,08	0,42	0,62
Galeguay	69,80	79,26	87,00	8,10	11,24	15,80	0,04	0,68	11,21
Galeguaychu	68,60	79,12	86,00	8,70	11,26	15,10	0,05	0,99	21,97
La Paz	60,00	78,90	85,00	8,60	10,30	13,20	0,08	0,90	14,74
Nogoya	63,80	79,34	86,70	9,00	11,77	16,40	0,03	1,84	78,83
Parana	66,00	79,31	86,00	8,30	11,23	17,80	0,04	1,19	50,02
San Salvador	81,80	81,80	81,80	10,70	10,70	10,70	0,53	0,53	0,53
Tala	73,70	80,59	85,90	8,30	10,85	13,80	0,08	0,73	4,60
Uruguay	69,00	79,72	86,00	8,40	10,32	14,30	0,04	0,73	14,29
Victoria	71,60	79,22	85,60	9,00	11,77	15,50	0,07	1,30	48,48
Villaguay	78,10	78,10	78,10	9,10	9,10	9,10	0,60	0,60	0,60
Entre Ríos	-	79,53	-	-	11,16	-	-	1,04	-