


INFORME SEMANAL N° 956

Fecha: 4 de febrero de 2021

Lluvias: BREVES CONSIDERACIONES CLIMÁTICAS. Dr José Luis Aiello  
Detalles:



METODO  
FORTE LAY  
AIELLO

---

Reservas:

Detalles: &lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Comienzo mostrando c&acute;mo est&acute; la distribuci&acute;n de humedad ed&acute;fica en la regi&acute;n pampeana, con el mapa que fue producido el lunes 1/2/2021.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;La oferta de agua que hemos recibido ha producido la distribuci&acute;n que pueden ver en el mapa, y en particular, la Provincia de Entre R&acute;os presente buenas condiciones en su &acute;rea oeste y d&acute;ficit de humedad en el este. Las &lt;ltimas lluvias beneficiaron a zonas productoras de importancia pero no llegaron a mejorar los bajos valores de las &acute;reas este. El sur se encuentra en una situaci&acute;n regular a buena, y si pensamos en un cultivo como la soja, los valores son mayores a los del mapa (que representa a una pradera permanente).&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;La semana en la que entramos ser&acute; de lluvias por debajo de sus valores normales y a partir del 10 de febrero hay una interesante probabilidad de lluvias que ser&acute;an las que nos permitir&acute;an seguir con el desarrollo de los cultivos implantados.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Tal como fuimos emitiendo en informes pasados, EN UN A&ntilde;O NI&ntilde;A COMO EL ACTUAL, LOS FORZANTES &ldquo;EXTRA PAC&iacute;FICO&rdquo; SON FUNDAMENTALES PARA LA PROVISI&Oacute;N DE LLUVIAS Y LA SITUACI&Oacute;N ACTUAL ES LA SIGUIENTE:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;1) LA NI&ntilde;A HA AUMENTADO SU INTENSIDAD PASANDO A OPERAR DESDE UNA MODERADA A LA ACTUAL, QUE PUEDE CONSIDERARSE FUERTE!&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;2) LO BUENO ES QUE LOS &ldquo;FORZANTES&rdquo; EST&Aacute;N ACTIVOS, Y TANTO EL ANTICICL&Oacute;N DEL ATL&Aacute;NTICO COMO LA DISTRIBUCI&Oacute;N T&Eacute;RMICA DEL ATL&Aacute;NTICO SUR JUEGAN A FAVOR&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;EL ESCENARIO QUE PUEDE RESULTAR EL M&Aacute;S PROBABLE ES EL QUE PERMITIR&iacute;a FINALIZAR LA ACTUAL CAMPA&ntilde;a CON &ldquo;NORMALIDAD&rdquo;, cuesti&acute;n que, como hacemos permanentemente seguiremos en SIBER d&iacute;a a d&iacute;a.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

## Sección: COSECHA DE GIRASOL

Las condiciones climáticas de las últimas semanas no fueron propicias para dar continuidad a las labores de cosecha. Los colaboradores reportan que la gran mayoría del área implantada se encuentran en madurez comercial y a la espera de ser recogida.

## Sección: CONDICIÓN DE SORGO



El área destinada al cultivo de sorgo se posicionaría alrededor de las 100.000 ha, cifra que será verificada con el procesamiento de imágenes satelitales.

El estado fenológico es amplio, desde lotes en estado vegetativo (fechas de siembra tardías) hasta sitios con un avance importante en el llenado de los granos (fechas de siembra tempranas), ver Figura 1.

La condición del cultivo a nivel provincial es la siguiente:

- Muy buena: 11 %
- Buena: 81 %
- Regular: 7 %
- Malo: 1 %

En general la condición del cultivo es buena, si bien el déficit hídrico marcó un estrés en las plantas, hoy se ha

---


recuperado en gran medida.

La condición regular hace recurrencia a los sitios con inconvenientes como baja densidad de plantas y problemas de malezas.

Respecto al estado sanitario se detectó presencia de pulgón y se evalúa la densidad de individuos y el daño para realizar el control de los mismos.

Los colaboradores mencionan que se reiteran los daños de cogolleros y, por lo tanto, se continúan con aplicaciones para su respectivo control.

## Sección: CONDICIÓN DE MAÍZ TARDÍO/SEGUNDA



En base a consultas efectuada a la red de colaboradores se estima que la superficie cultivada con maíz tardío y de segunda en la provincia de Entre Ríos en el ciclo 2020/21 sería similar a lo registrado el año pasado. Cabe recordar que el ciclo 2019/20 tuvo un área implantada de 23.800 ha.

El estado fenológico se ubica entre V2 (dos desplegadas) a V10 (diez hojas desplegadas), ver Figura 2.

La condición del cultivo en la provincia es la siguiente:

- Muy buena: 25 %
- Buena: 72 %
- Regular: 3 %

Las precipitaciones favorecieron el desarrollo de las plantas y generó un cambio en el cultivo, puntualmente en los sitios donde el déficit hídrico era más marcado (zona sur de Entre Ríos).

El cereal en general cuenta con un buen estado sanitario y adecuados controles de malezas. Se han realizado refertilizaciones nitrogenadas.

---

En algunos sitios los colaboradores reiteran la presencia de gusano cogollero.