
INFORME SEMANAL N ° 1001

Fecha: 16 de diciembre de 2021


Lluvias: PRECIPITACIÓN ACUMULADA DEL 08 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2021

Detalles: <p style="text-align: justify;">La última semana ha transcurrido con una ligera mejora en la oferta de agua, con reas reducidas donde se concretaron chaparrones generosos, pero en general, con un escenario que en promedio areal es bastante modesto.
Algunas lloviznas aparecieron ingresando al fin de semana, pero odo que se mantuvo inestable y que convergi en un mayor nivel de actividad cambiando del domingo para el lunes. Para entonces algunas tormentas muy destacadas que se formaron sobre la franja central de SF, avanzaron sobre el departamento Paraná. Sin embargo este comportamiento no pudo sostenerse. En el recorrido hacia el este, las tormentas se dispersaron, siendo algo productivas sobre la franja central. En el cierre de esta semana de analisis, aparecieron algunas tormentas vespertinas durante el martes e incluso la madrugada del miércoles. Las mismas se desplegaron principalmente sobre el sudeste de la provincia, como efecto marginal de lo que se observaba en la zona de influencia del estuario del Río de la Plata.
La oferta de agua de la primera quincena de diciembre ha quedado lejos de ser satisfactoria. Por lo pronto la nica buena noticia es que las temperaturas no han resultado demasiado elevadas. De todas maneras el ambiente no est resultando favorable, principalmente para reas con lotes en cultivos que ya ingresaron en floracin.
Las perspectivas de lluvias en el corto plazo aparecen para el odo que va entre el final del domingo y el martes. Se espera que para entonces llegue un nuevo sistema frontal, los cuales estn apareciendo con una frecuencia de entre cinco y siete as. Es una frecuencia adecuada, tambin es adecuada la humedad atmosfrica en capas bajas. Sin embargo, la estructura media de la atmsfera esta sesgada por la zona de alta presin, con fuerte tendencia a desorganizar las perturbaciones, trabajando en contra del desarrollo vertical de la nubosidad.</p>



PRECIPITACIÓN ACUMULADA

08/12/21 al 14/12/21 (9hs 15/12)




Reservas: ESTADO DE LAS RESERVAS AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021

Detalles: """"El balance hídrico se complica con el comportamiento pluvial que venimos observando. Observemos que en la zona de influencia de Paran´, donde han llovido m´s de 30 milímetros, las reservas se sostienen con un nivel un poco m´s holgado, sin llegar a ser el adecuado.
""Esto nos remite a recordar que esta cantidad es el valor mínimo semanal como para que los perfiles de suelo no vean resentido su nivel de reservas. En una cuenta sencilla e ideal la provincia al menos debería haber acumulado sesenta milímetros. Los faltantes, deben ser resueltos por las reservas y si los perfiles est´n ajustados, las ´reas con tendencia a evolucionar hacia estados de sequía aumentan su extensi´n.
""Como podemos ver en el mapa de reservas, la zona m´s seca se ha consolidado sobre el este, avanzado hacia el departamento Nogoy´. Los escasos milímetros de m´s que han sumado ´reas del centro y del sur, evitan por lo pronto que esta condici´n se expanda aún m´s. No obstante, los requerimientos pluviales perentorios no encuentran excepci´n en todo el territorio provincial. Por sectores la demanda puede ser mayor, en otros menor, pero queda claro que este nivel de precipitaciones es muy pobre para sostener las reservas en niveles satisfactorios.
""Objetivamente, el panorama para el resto del mes de diciembre no es el mejor. Como decíamos entre domingo y martes pueden aparecer precipitaciones no solo sobre ER, sino en gran parte de la franja central. Los volúmenes de lluvias previstos, siguen siendo pobres, insuficientes para sostener la demanda de cultivos en floraci´n, posiblemente algo mejor para que la soja sobrelleve su desarrollo vegetativo.
""No se descarta alguna sorpresa positiva en la oferta de agua, sin embargo esto sería muy discrecional y limitado a ´reas reducidas. Para el an´lisis de gran escala que estamos haciendo, lo m´s probable es que el mes de diciembre mantenga un paso pluvial alejado de las necesidades hídricas de los suelos.<p>



ESTADO DE LAS RESERVAS al 15/12/21



METODO
FORTE LAY
MIELLO

Sección: GRANIZO

El domingo 12 de diciembre del 2021 un frente de tormenta ingresó al territorio provincial con vientos predominantes del sector Sur – Sudeste.

En la Figura 1 se muestra los datos provenientes de la central meteorológica automática localizada en la Segunda Brigada Aérea, tal como es presentado en la página web de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos.

Se destaca que la precipitación inició a las 21:00 h y hubo ráfagas de viento de hasta 89,8 km/h.

Datos provenientes de la central meteorológica automática ubicada en la II Brigada Aérea de Paraná

Fecha ^	Nivel de Lluvia [mm]	Velocidad de Viento [Km/h]	Rafaga de Viento [km/h]
12/12/2021 20:50 hs.	0,0	17,5	66,4
12/12/2021 21:00 hs.	7,0	34,5	89,8
12/12/2021 21:10 hs.	17,8	27,1	75,5
12/12/2021 21:20 hs.	8,2	15,7	33,5
12/12/2021 21:30 hs.	2,6	15,4	42,6
12/12/2021 21:40 hs.	0,8	12,3	31,4
12/12/2021 21:50 hs.	0,2	7,6	17,4
12/12/2021 22:00 hs.	0,2	6,4	10,8
12/12/2021 22:10 hs.	0,2	5,7	13,4
12/12/2021 22:20 hs.	0,4	8,4	15,6
12/12/2021 22:30 hs.	0,6	8,4	15,1
12/12/2021 22:40 hs.	0,8	4,4	12,7
12/12/2021 22:50 hs.	1,0	2,5	5,8
12/12/2021 23:00 hs.	0,4	5,5	8,9

Sección:



En la Figura 2 se puede visualizar el ingreso de la tormenta captada por el satélite Goes – 16 y las imágenes de la Red de Radars del INTA de las 21:10 horas.

En la imagen generada por los radares, se detalla un pequeño núcleo de tormenta que se asoció a la caída de granizo entre las localidades de Aldea Salto, Aldea Grapschental y Aldea Spatzenkutter.

Satélite GOES – 16


Fecha 12/12/2021

Hora Argentina 21:10



Sección:

El evento de granizo se focalizó dentro del distrito Palmar (Dpto. Diamante), en la Figura 3 obtenida del satélite Sentinel 2 correspondiente a la primera semana de diciembre, se detectan fácilmente lotes de maíz de primera (tonalidades rojizas) que ya cuentan con una buena cobertura, mientras que los lotes sembrados con soja de primera y segunda todavía no pueden ser detectados debido al escaso desarrollo.



Sección:

En la Figura 4 se presentan imágenes enviadas por nuestros Colaboradores que dan evidencia de los graves daños registrados en lotes con cultivos de maíz de primera y soja de primera, aunque también hubo reportes de daños en soja de segunda.

Al ser un evento reciente, aún es prematuro para poder cuantificar las pérdidas con precisión.



Sección: SIEMBRA DE SOJA DE PRIMERA



La siembra de soja de primera ha finalizado en la provincia, con una intención similar a la lograda en la campaña pasada que fue de 589.600 ha.

La fenología del cultivo es muy amplia y se ubica desde emergencia a V8 (8 nudos en el tallo principal). Esta variación se debe a que las labores de siembra acompañaron los pulsos de las precipitaciones. Figura 5.

La condición general y el estado sanitario de la oleaginosa es bueno.

Sección: SIEMBRA DE SOJA DE SEGUNDA

El avance de siembra de soja de segunda se encuentra condicionado por la falta de humedad en el perfil edáfico. A la fecha se lleva sembrado un 80 % de la superficie proyectada para la presente campaña agrícola en Entre Ríos, cercana a 479.100 ha.

Si se compara el progreso en la siembra con respecto al ciclo anterior, prácticamente los valores son similares.

Sección: CONDICIÓN DE SORGO



La presencia de pulgón en el cultivo de sorgo, ha determinado en algunos casos que el productor tome la decisión de no sembrar los lotes que aún restaban para finalizar con el total del área intencionada. Esta superficie se destinaría a cultivos de verano como soja de segunda y/o girasol tardío.

El estado fenológico del cultivo varía desde V4 a V8 (4 a 8 hojas expandidas). Figura 6.

La condición del sorgo a nivel provincial es la siguiente:

- Muy buena: 13 %
- Buena: 84 %
- Regular: 3 %

En relación al estado sanitario, se han realizado controles para pulgón en los primeros lotes.

Sección: CONDICIÓN DE GIRASOL



La superficie destinada a girasol en la provincia se ubicaría cercana a las 11.000 ha, aproximadamente el doble de lo sembrado en el ciclo anterior.

En girasol en Entre Ríos se ubica desde R3 (botón floral) a R5 (floración). Figura 7.

La condición del cultivo a nivel provincial de buena a muy buena.