


Fecha: 10 de febrero de 2022

### Lluvias: LA NIÑA: LA PREOCUPACIÓN PERSISTE

Detalles: &Espan style="font-size: small;">&quot;&gt;l fen&ocute;meno de &ldquo;La Ni&ntilde;a&rdquo; fue pronosticado con claridad, por los principales centros de investigaci&ocute;n del clima a nivel mundial, en el segundo semestre del 2021.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size: small;">&quot;&gt;La Oficina de Meteorolog&iacute;a del Gobierno Australiano (Australian Government Bureau of Meteorology) en su &uacute;ltima actualizaci&ocute;n del 01/Feb/2022 informa:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size: small;">&quot;&gt;La Perspectiva ENSO permanece en &ldquo;La Ni&ntilde;a&rdquo;, con la mayor&iacute;a de los indicadores atmosf&eacute;ricos y oce&acute;nicos persistiendo en los niveles de &ldquo;La Ni&ntilde;a&rdquo;.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size: small;">&quot;&gt;Las &uacute;ltimas observaciones oce&acute;nicas, junto con la mayor&iacute;a de las perspectivas de los modelos, sugieren que este evento de &ldquo;La Ni&ntilde;a&rdquo; est&acute; en su punto m&acute;ximo o cerca de &eacute;l, con un regreso a las condiciones neutrales de &ldquo;El Ni&ntilde;o - Oscilaci&ocute;n del Sur&rdquo; (ENOS) pronosticado a principios del oto&ntilde;o del hemisferio sur. Esto es consistente con el ciclo de vida t&iacute;pico de un evento ENOS.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size: small;">&quot;&gt;An&acute;logas conclusiones fueron publicadas por la NOAA (Administraci&ocute;n Nacional del Oc&eacute;ano y la Atm&ocute;sfera) en su reporte del 10/Feb/2022, donde se puede observar en el mapa que todav&iacute;a persiste el enfriamiento del Pac&iacute;fico Ecuatorial.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size: small;">&quot;&gt;La Figura 1 muestra la precipitaci&ocute;n promedio, obtenida de los registros pluviom&eacute;tricos del SIBER del periodo (2004 &ndash; 2020), para los meses de noviembre a febrero y lo acontecido en el ciclo 2021/22 junto con la variaci&ocute;n registrada.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size: small;">&quot;&gt;Hasta el momento, el mayor impacto de &ldquo;La Ni&ntilde;a&rdquo; se registr&ocute; en el mes de diciembre, donde la disminuci&ocute;n de la precipitaci&ocute;n fue del 88 % (119 mm) y cuyo mayor impacto se vio reflejado en la ca&iacute;da del rendimiento del ma&iacute;z de primera.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size: small;">&quot;&gt;No obstante, es importante analizar lo que ocurra en febrero. La lluvia acumulada a nivel provincial en los primeros 10 d&iacute;as fue de 15 mm, es decir apenas el 11 % del promedio que se ubica en 140 mm. En el corto plazo, los pron&ocute;sticos no anuncian lluvias significativas para la regi&ocute;n, as&iacute; que habr&acute; que aguardar que lo que deparan las lluvias en la segunda quincena. Mientras tanto, es l&ocute;gico pensar que la situaci&ocute;n de reservas escasas y el &acute;rea de sequ&iacute;a seguir&acute; extendi&eacute;ndose en el centro &ndash; Norte y el Suroeste de la provincia.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size: small;">&quot;&gt;El actual escenario es una alerta amarilla, ya que la soja de primera est&acute; en estado reproductivo y por comenzar su periodo cr&iacute;tico, donde la variable precipitaci&ocute;n juega un rol preponderante en la definici&ocute;n del rendimiento.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

Anomalies (°C)




Fuente: National Oceanic and Atmospheric Administration

<https://www.cpc.ncep.noaa.gov>



Fuente: Australian Government Bureau of Meteorology

<http://www.bom.gov.au>



---

## Reservas: CONDICIÓN DE SOJA DE PRIMERA

Detalles: El área implantada en el ciclo 2021/22 con soja de primera en la provincia de Entre Ríos se posiciona alrededor de 500.000 ha, esto representa una disminución del 18 % (89.600 ha) y se relaciona fundamentalmente con el crecimiento detectado en la superficie dedicada al maíz de primera. Estos ajustes surgen del procesamiento de imágenes satelitales, donde se detecta una expansión del cereal y que a la brevedad la Bolsa de Cereales de Entre Ríos publicará. El estado fenológico se posiciona entre R2 (fin de floración) a R4 (comienzo de formación del grano). Figura 2. La condición del cultivo a nivel provincial es la siguiente: -Muy buena: 24 % -Buena: 53 % -Regular: 17 % -Mala: 6 % Los colaboradores reportan que la condición de la oleaginosa es muy variable y está determinada fundamentalmente por el acumulado de las precipitaciones, efecto de la temperatura, implantación del cultivo, tipo de suelo, grupos de madurez entre otros. Con respecto al estado sanitario, hay presencia de: orugas, chinches y arañas, habiéndose realizado tratamientos con para su control en algunos casos.



---

## Sección: CONDICIÓN DE SOJA DE SEGUNDA



La superficie cultivada con soja de segunda en la provincia de Entre Ríos se ubicaría alrededor de 550.000 ha. La fenología de la soja de segunda se ubica desde V9 (nueve hojas desarrolladas) a R3 (comienzo de formación de vainas). Figura 3.

La condición del cultivo a nivel provincial es la siguiente:

- Muy buena: 18 %
- Buena: 57 %
- Regular: 18 %
- Mala: 7 %

Los colaboradores destacan que en general, se observa escaso desarrollo, aún no cerraron entresurco.

Por otra parte, es importante destacar que existen lotes donde la oleaginosa tuvo registró una disminución significativa en el número de plantas por hectárea a consecuencia de la sequía.

Actualmente se están realizando aplicaciones para el control de malezas, fundamentalmente gramíneas y en lotes puntuales tratamientos para orugas.

Es de suma importancia la ocurrencia de precipitaciones en el corto plazo para mantener la condición, tanto en soja de segunda como soja de primera.

---

## Sección: COSECHA DE GIRASOL

El área implantada con girasol en el ciclo 2021/22 es de aproximadamente 11.000 ha.

A nivel provincial se ha cosechado aproximadamente el 70 %. El rendimiento promedio provincial se posiciona en 1.700 kg/ha con un rango que a nivel de lote se ubica desde 1.000 a 2.300 kg/ha.

Los colaboradores reportan que, en algunos lotes se atrasó la cosecha por efecto de las precipitaciones, lo cual trajo aparejado una merma debido al ataque de las palomas.